

مزایای فرزندآوری

بدون تردید فرزند آوری و پدر و مادر شدن یکی از پر احساس ترین تجربیات هر انسانی است. این تمایل فطری است و برای تداوم نسل و بقاء انسان‌ها ضروری می‌باشد. لازم است بدانید در متون علمی منع مطلق سنی برای بارداری وجود ندارد اما هر چه سن مادر در بارداری کمتر باشد بهتر است، در سنین بالاتر نیز احتمال بارداری و فرزندآوری سالم با مراقبت‌های لازم میسر است. در سالهای اخیر ۵۰ تا ۷۰٪ زنان باردار در آمریکا و کشورهای اروپایی، در سن بالای ۴۰ سال بوده است. در کانادا هم ۱۱ درصد کسانیکه برای اولین بار مادر می‌شوند بالای ۳۵ سال سن دارند.

تولد نوزاد، نشانه دیگری از معجزه عشق و زندگی میان زوجینی است که پیوند شان را مستحکم‌تر کرده‌اند. نخستین کلمه‌ای که کودک به زبان می‌آورد، اولین قدمی که برمی‌دارد، نخستین دندانی که در می‌آورد، اولین جشن تولدی که برایش گرفته می‌شود و ... از نقاط عطف زندگی زنا شویی به شمار می‌آیند. یکی از بهترین هدایایی که زوجین می‌توانند به یکدیگر بدهند و پیوند شان را مستحکم کنند، تولد فرزند است. باید بدانید که بارداری و شیردهی فوائد بیشماری دارد که در ادامه به برخی از آنها اشاره می‌شود:

فوائد بارداری و شیردهی:

- ✓ نسبت سلطان سینه در زنانی که بچه ندارند (نولی پار) به زنانی که ۲ و بیشتر بچه دارند (مولتی پار) ۱,۷ تا ۱,۲ براورده شده است. یعنی حاملگی اثر پیشگیری کننده بر سلطان پستان دارد.
- ✓ هرچه سن اولین بارداری ای که به انتهای رسیده باشد (ترم شده یعنی بالای ۳۷ هفتة) پایین تر باشد، این اثر محافظتی بیش تر است.
- ✓ این اثر محافظتی بارداری بر روی سلطان پستان تا ۱۰ سال است. پس منطقاً هرچه اولین بارداری زودتر و آخرین بارداری دیرتر باشد، به طور کلی ضریب محافظتی بالاتر می‌رود.
- ✓ اولین علت ذکر شده برای سلطان تخدمان در کتاب‌های مرجع پزشکی، زایمان کم یا نازایی است.
- ✓ نولی پاریتی یا تجربه نکردن حتی یک زایمان، از عوامل خطر قطعی سلطان تخدمان است.
- ✓ مطالعات اثبات می‌کند یک بارداری بیش از ۲۰ هفتة، اثر محافظتی نسبت به ایجاد فیبروم در رحم زنان است. (فیبروم‌ها شایع ترین علت هیستوتومی یا درآوردن رحم هستند)
- ✓ مطالعات نشان می‌دهد هرچه سن اولین بارداری کمتر باشد، ریسک ابتلا به فیبروم کاهش می‌یابد و هرچه فواصل بین بارداری‌ها بیش تر باشد، ریسک ابتلا به فیبروم بیشتر است.
- ✓ در مطالعه‌ای نسبت ابتلابه فیبروم در یک خانم نولی پار (بدون زایمان) به خانم مولتی پار (دراین پژوهش: ۵ زایمان) ۵ برابر گزارش شده است.
- ✓ حاملگی باعث تحلیل و بهبود ان-domtriyoze می‌شود. حاملگی در بعضی افراد باعث بهبود کامل و در برخی باعث سرکوب عالیم در طی حاملگی می‌شود. (ان-domtriyoze، وجود بافت رحم در جایی غیر از رحم است که مشکلات زیادی به وجود می‌آورد)
- ✓ مطالعات متعدد نشان می‌دهد که شیردهی باعث کاهش سلطان‌های پستان و تولیدمثلی می‌شود.
- ✓ پژوهش‌ها نشان می‌دهد خانم‌هایی که حداقل به مدت دو سال تجمعی شیردهی داشته‌اند، در آینده ۲۳٪ کمتر به بیماری‌های قلبی عروقی مبتلا می‌شوند.

- ✓ در مطالعه ای نشان داده شد هر ۱۲ ماه شیردهی، ریسک ابتلا به سرطان پستان را ۴,۳٪ کاهش می دهد. هر بارداری و زایمان هم این ریسک را حدود ۷٪ کاهش می دهد.
- ✓ حداقل میزان شیردهی به ازای هر کودک ۱۸ ماه و حداقل آن ۲۴ ماه باشد تا بهترین اثر بخشی شیردهی را در محافظت از بروز سرطان پستان در مادر داشته باشیم.
- ✓ بیشترین اثر محافظتی برای مادران شیرده به ازای هر کودک شیردهی به مدت ۲ سال تمام می باشد